

漢方薬(医療用) 小児用量の目安	年齢	3か月	6か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳
	平均体重	6.2kg	7.8kg	9.0kg	11.3kg	13.4kg	15.4kg	17.6kg	20.0kg	22.9kg	25.8kg	29.2kg	33.0kg	37.4kg	42.5kg
	成人量×比	1/6～1/5	1/5～0.23	0.24～0.27	0.28～0.3	0.32～0.34	0.36～0.37	0.4	0.44～0.45	0.48～1/2	0.52～0.56	0.6	2/3	0.7	3/4～0.8
ツムラ 通常	7.5g	1.25～1.5g	1.5～1.7g	1.8～2g	2.1～2.3g	2.4～2.6g	2.7～2.8g	3g	3.3～3.4g	3.6～3.75g	3.9～4.2g	4.5g	5g	5.25g	5.6～6g
コタロー 桔梗石膏 クラシエ 麻黄湯・芍薬甘草湯	6g	1～1.2g	1.2～1.4g	1.4～1.6g	1.7～1.8g	1.9～2g	2.2g	2.4g	2.6～2.7g	2.9～3g	3.1～3.4g	3.6g	4g	4.2g	4.5～4.8g
ツムラ 小青竜湯・麦門冬湯・ 白虎加人参湯・清肺湯・柴苓湯	9g	1.5～1.8g	1.8～2g	2.2～2.4g	2.5～2.7g	2.9～3g	3.2～3.3g	3.6g	4g	4.3～4.5g	4.7～5g	5.4g	6g	6.3g	6.75～7.2g
ツムラ 小建中湯	15g	2.5～3g	3～3.4g	3.6～4g	4.2～4.5g	4.8～5g	5.4～5.6g	6g	6.6～6.8g	7.2～7.5g	7.8～8.4g	9g	10g	10.5g	11.2～12g
ツムラ 黃耆建中湯	18g	3～3.6g	3.6～4.1g	4.3～4.8g	5～5.4g	5.7～6g	6.5～6.7g	7.2g	7.9～8.1g	8.6～9g	9.4～10g	10.8g	12g	12.6g	13.5～14.4g

※ 平均体重は、西暦2000年度の日本人の男女を合わせた平均体重です。男女別の平均体重との差は、1歳以下では5%未満、2歳～12歳では3%未満です。

※ 成人量に対する比は、以下の式・表による計算値の範囲をサポートしています。

年齢	サポートしている式・表の範囲
1歳未満	Crawford式、von Harnackの表
1～8歳	Crawford式、Augsberger式、von Harnackの表
9歳以上	Crawford式

※ Augsberger式は、1～8歳以外の範囲では、Crawford式との乖離が大きくなるため、サポートしていません。

※ von Harnackの表の12歳の値は、Crawford式との乖離が大きいため、サポートしていません。